



Sinónimos

Q. stenophylla Pittier

Nombres comunes

cinco dedos (PA), guácimo molenillo (CR), guayabillo (PA), garrocho (CR, PA), panula (PA), palo cuadrado (PA)



Usos y Manejo en finca

La madera es liviana y es poco usada, pero puede usarse en construcción (interior o exterior tratada) y chapas no decorativas. También tiene un excelente potencial para pulpa de celulosa. Los frutos son uno de los alimentos preferidos por muchas especies de animales dentro del bosque – monos, pizotes, agutíes, chanchos de monte, murciélagos y algunas aves.

Sistemas de finca

Se aprovecha directamente del bosque natural. Lo atractivo de sus frutos para la fauna lo hace una opción para la restauración del bosque.



Distribución

Ecología

Esciófita parcial, crece y madura bajo sombra, solamente en bosque lluvioso y lluvioso premontano de tipo primario y secundario. Es característica del bosque maduro y es uno de los árboles más abundantes en el bosque de la isla de Barro Colorado (Panamá), pero es raro y menos frecuente en los bosques lluviosos de la cordillera atlántica del Canal. Se encuentra más co-

múnmente en pendientes, sitios altos y a lo largo de quebradas, que en bajuras y pantanos. Densidades típicas son de 10 árboles/ha (DAP mayor de 20 cm), con 40 juveniles/ha (1-20cm DAP)

Natural

Costa Rica (vertiente atlántica, zona sur), Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.



